

**ETUDE D'EFFICACITE ET DE TOLERANCE DE MIGRASTICK DANS LE
TRAITEMENT DE LA MIGRAINE (Dr SCHWOB)**

OBJECTIF DE L'ETUDE	Evaluer l'efficacité et la tolérance de Migrastick dans le traitement de la migraine.
METHODOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> - 21 patients - Période de Pre-inclusion de 15 jours - Durée de l'étude : 2 months - Consultations aux jours J -15, J 0, J 60 - <i>Critères d'inclusion</i> : patients souffrant de migraines depuis au moins 1 an et au moins 1 fois par semaine, migraine définie selon les critères de classification des maux de tête publiés par the International Headache Society en 1988. - <i>Critères d'évaluation</i> : nombre de migraines, evaluation de l'efficacité et de la tolerance (durée de la crise, l'intensité de la douleur et des signes associés - nausées, vomissements) par les patients et les médecins (mauvais à excellent)
TRAITEMENTS	Migrastick est à utiliser en cas de crises migraineuses et peut éventuellement être associé à l'un des 2 médicaments traditionnels contre la migraine prédéfinis pour l'étude.
RESULTATS	<p><i>Nombres de migraines</i> : 1 tous les 3 jours avant le traitement, 1 tous les 5 jours durant l'étude.</p> <p><i>Evaluation de l'efficacité par les patients et les médecins :</i> Patient : 62% excellente, 29% bonne, 4.5% médiocre, 4.5 % mauvaise Médecin : 71 % excellente, 19% bonne, 10 % médiocre, 0 % mauvaise</p> <p><i>Evaluation de la tolérance par les patients et les médecins :</i> Patient: 76% excellente, 9.5 % bonne, 9.5% médiocre, 5 % mauvaise Médecin: 71 % excellente, 19% bonne, 4.5 % médiocre, 4.5 % mauvaise</p>
CONCLUSION	This study confirmed the effectiveness and the very good tolerance of Migrastick in migraines.