

EFFECTIVITEITS EN TOLERANTIESTUDIE VAN MIGRASTICK GEDURENDE DE BEHANDELING MET MIGRASTICK (DR SCHWOB)

| | |
|--------------------|---|
| DOEL VAN DE STUDIE | Evaluatie van de effectiviteit en tolerantie van Migrastick tijdens de behandeling van migraine. |
| METHODE | <ul style="list-style-type: none"> - 21 patiënten - Pre gebruikperiode van 15 dagen - Duur van de studie: 2 maanden - Gebruiskriteria: minstens één jaar één keer per week last van migraine, migraine omschreven volgens de hoofdpijnklasse criteria die in 1988 gepubliceerd is door de Internationale Hoofdpijn Gemeenschap - Evaluatie criteria: hoe vaak migraine, evaluatie van de effectiviteit en tolerantie gedurende de migraine aanvallen, intensiviteit van de pijn en geassocieerde symptomen (misselijkheid en overgeven) door de patiënt en de dokter (slecht tot uitstekend) |
| BEHANDELINGEN | Migrastick wordt gebruikt tegen migraine aanvallen en kan ook in combinatie gebruikt worden met 2 traditionele medicijnen tegen migraine zoals vooraf omschreven in de studie. |
| RESULTATEN | <p>Aantal migraine: voor de studie elke 3 dagen één, tijdens de studie elke 5 dagen één.</p> <p>Evaluatie van de effectiviteit door de patiënt en de dokter Patiënt: 62% uitstekend, 29% goed, 4,5% matig, 4,5% slecht Dokter: 71% uitstekend, 19% goed, 10% matig, 0% slecht</p> <p>Evaluatie van de tolerantie door de patiënt en de dokter Patiënt: 76% uitstekend, 9,5% goed, 9,5% matig, 5% slecht Dokter: 71% uitstekend, 19% goed, 4,5% matig, 4,5% slecht</p> |
| CONCLUSIE | Deze studie bevestigt de effectiviteit en goede tolerantie bij migraine |